

VerdeVivo

Tu Futuro, Nuestro Presente

NARANJO / MANDARINO



FOLIAR




FERTIRRIGACIÓN



Parada
invierno

BBCH 00



Brotación

BBCH 10-15



Inicio Floración
Plena Floración

BBCH 60-65



Fin Floración

BBCH 66-67



Cuajado

BBCH 71-73



Crecimiento
fruto

BBCH 74-79



Cambio color

BBCH 81-82



Maduración

BBCH 85-88

BUDGE

Mejorador de las condiciones de crecimiento de la planta de rápida respuesta

2 x 10 l/ha

2 x 0,3 %

2 x 10 l/ha

3 x 0,3 %

EXELGROW

Inductor de división celular. Estimulante de floración, precursor de citoquininas naturales.

0,15 %

0,1 %

FOLICAL

Engorde, elasticidad y resistencia pared celulares

0,25 %

BOOST

Bioestimulante precursor de auxinas

1 kg/ha

0,05 %

1 kg/ha

0,05 %

CYBELION

Protector de floración, hoja y fruto. Aumento de calibres

2 x 0,15 %

2 x 0,15 %

NEPTUNION

Regulador estrés abiótico, osmoprotector

3 x 1,5 l/ha

NARANJO / MANDARINO



FOLIAR



FERTIRRIGACIÓN



2 x 10 l/ha

0,3 %

- Tratamiento para mover savia, desarrollar la brotación y salir del invierno. Separar los tratamientos entre 7 y 10 días

- Mejorador de las condiciones de crecimiento de la planta de rápida respuesta



1,5 l/ha

0,15 %

- Promotor del crecimiento de meristemo, aporte de citoquininas naturales, mejora cuajado, engorde

- Doble fermentación mediante el uso de diferentes cepas del género LACTOBACILLUS



1 kg/ha

0,05 %

- Enraizante de acción auxínica, formación de raíces nuevas

- Precursor de auxinas



3 l/ha

- Elicitor que aumenta la resistencia del cultivo, fortalece la planta frente a situaciones desfavorables

- Tratamiento de diferenciación y protección del fruto



1,5 l/ha

1,5 l/ha

- Estrés abiótico (bajas temperaturas, sequía, salinidad etc.) aumentando la tolerancia del cultivo

- Previene estrés de la planta y facilita la actividad en condiciones climatológicas desfavorables

